

**КРОВЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В АКУШЕРСКОЙ
ПРАКТИКЕ**

Клинические рекомендации (протокол)

**Москва
2014**



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минздрав России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Рахмановский пер., 3, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

№ 15-410/2-3198

На № _____ от _____


Руководителям органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере
охраны здоровья

Ректорам государственных
бюджетных образовательных
учреждений высшего
профессионального образования

Директорам федеральных
государственных учреждений науки

Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет клинические рекомендации (протокол лечения) «Кровесберегающие технологии в акушерской практике», разработанные в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», для использования в работе руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья при подготовке нормативных правовых актов, главными врачами перинатальных центров и родильных домов (отделений), руководителями амбулаторно-поликлинических подразделений при организации медицинской помощи женщинам во время беременности, родов и в послеродовом периоде, а также для использования в учебном процессе.

Приложение: 41 л. в 1 экз.


Т.В. Яковлева

СОГЛАСОВАНО:

Главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
по акушерству и гинекологии
Адамьян В.В., профессор

Л.В. Адамьян


2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Президент Российского общества
акушеров-гинекологов
академик РАН, профессор

В.Н. Серов

2014 г.



КРОВЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

Клинические рекомендации (протокол)

Коллектив авторов:

**Сухих
Геннадий Тихонович**

директор ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова»
Минздрава России, академик РАН, профессор,
д.м.н.

**Серов
Владимир Николаевич**

президент российского общества акушеров-
гинекологов, академик РАН, профессор

**Адамьян
Лейла Владимировна**

заместитель директора ФГБУ «НЦАГиП
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, главный
внештатный акушер-гинеколог Минздрава
России, академик РАН, профессор, д.м.н.

**Филиппов
Олег Семенович**

заместитель директора Департамента медицинской
помощи детям и службы родовспоможения,
профессор кафедры акушерства и гинекологии
ФПФОВ ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова» Минздрава России, д.м.н., профессор

**Башмакова
Надежда Васильевна**

директор ФГБУ «Уральский НИИ ОММ»
Минздрава России главный акушер-гинеколог
Уральского федерального округа, профессор, д.м.н.

**Баев
Олег Радомирович**

заведующий 1 акушерским отделением ФГБУ «НЦ
АГИП им. В.И. Кулакова» Минздрава России,
профессор, д.м.н.

**Бакурдзэ
Этери Мухамедовна**

врач акушер-гинеколог,
врач трансфузиолог отделения гравитационной
хирургии крови ФГБУ «НЦАГИП им.
В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н

**Быстрых
Оксана Анатольевна**

врач иммунолог, врач трансфузиолог отделения
гравитационной хирургии крови ФГБУ «НЦАГИП
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н.

**Виноградова
Мария Алексеевна**

старший научный сотрудник отделения
гравитационной хирургии крови ФГБУ
«НЦ АГИП им. В.И. Кулакова» Минздрава России,
к.м.н.

**Кан
Наталья Енсьиновна**

главный врач ФГБУ «НЦ АГИП им. В.И. Кулакова»
Минздрава России, д.м.н.

**Розачевский
Олег Владимирович**

ведущий научный сотрудник отделения
гравитационной хирургии крови ФГБУ
«НЦ АГИП им. В.И. Кулакова» Минздрава
России, д.м.н.

**Стрельникова
Елена Владимировна**

врач акушер-гинеколог, врач трансфузиолог
отделения гравитационной хирургии крови ФГБУ
«НЦАГИП им. В.И. Кулакова» Минздрава России,
к.м.н.

**Тютюнник
Виктор Леонидович**

заведующий 2 акушерским отделением ФГБУ
«НЦАГИП им. В.И. Кулакова» Минздрава России,
д.м.н.

**Тегурашвили
Нана Каргლოსана**

заведующий 2 акушерским отделением патологии
беременности ФГБУ «НЦАГИП им. В.И. Кулакова»
Минздрава России, д.м.н.

**Федорова
Татьяна Анатольевна**

заведующий отделением гравитационной
хирургии крови ФГБУ «НЦ АГИП им. В.И.
Кулакова» Минздрава России, профессор, д.м.н.

Рецензенты:

**Радзинский
Виктор Евсеевич**

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии медицинского
факультета ГБОУ ВПО «РУДН» Минобрнауки
России, доктор медицинских наук, профессор

**Макаров
Олег Васильевич**

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
ГБОУ ВПО «РНИМУ им Н.И. Пирогова»
Минздрава России, профессор, д.м.н.

**Дубнин
Андрей Юрьевич**

руководитель отдела анестезиологии-
реаниматологии и интенсивной терапии ФГБУ
«НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко»
РАМН, председатель Московского научного
общества анестезиологов и реаниматологов,
профессор, д.м.н.

Оглавление

1. Аннотация	5-6
2. Список сокращений	7
3. Введение	8
4 Железодефицитная анемия	
4.1 Определенные анемии и значимость проблемы	9
4.2 Причины развития анемии и ее распространенность	9
4.3 Диагностика железодефицитной анемии	10-11
4.4 Лечение железодефицитной анемии у беременных	12-14
5 Аутоплазмодонорство	
5.1 Определение	15
5.2 Показания к заготовке и хранению аутоплазмы в акушерстве	15
5.3 Противопоказания к заготовке аутоплазмы в акушерстве	15
5.4 Показания к трансфузии аутоплазмы в акушерстве	15
5.5 Противопоказания к трансфузии аутоплазмы в акушерстве	15-16
5.6 Материально-техническое обеспечение технологии	16
5.7 Технология использования метода	16-18
5.8 Возможные осложнения, их профилактика и купирование	18
5.9 Эффективность использования метода	18-21
6 Нормоволемическая гемодиллюция	
6.1 Показания для нормоволемической гемодиллюции с аутогемотрансфузией	22
6.2 Противопоказания для нормоволемической гемодиллюции с аутогемотрансфузией	23
6.3 Методика проведения нормоволемической гемодиллюции с аутогемотрансфузией	23
6.4 Методика проведения нормоволемической гемодиллюции с аутогемотрансфузией	23-24
6.5 Возможные осложнения, их профилактика и купирование	24
6.6 Контролируемые лабораторные показатели	24
6.7 Эффективность проведения нормоволемической гемодиллюции с аутогемотрансфузией	24-29
7 Интраоперационная реинфузия аутоэритроцитов	
7.1 Показания и противопоказания к использованию метода	29-30
7.2 Материально-техническое обеспечение	30
7.3 Технология использования метода	30-31
7.4 Возможные осложнения, их профилактика и купирование	32
7.5 Эффективность использования метода	32-35
8 Приложение №1	36
9 Приложение №2	37
10 Приложение №3	38
11 Список литературы	39-42
	4

АННОТАЦИЯ

В рекомендациях представлены основные методы кровесбережения, используемые в акушерской практике. Доказательной базой для рекомендаций являются публикации, вошедшие в Кохрейновскую библиотеку, базы данных EMBASE, PUBMED и MEDLINE.

Оценка значимости рекомендаций приведена в соответствии с классификацией уровней их достоверности и доказательности (рейтинговой схемой (Приложение № 1)).

Настоящие рекомендации в предварительной версии были рецензированы независимыми экспертами, которых попросили прокомментировать прежде всего то, насколько интерпретация доказательств, лежащих в основе рекомендаций доступна для понимания.

Для окончательной редакции и контроля качества рекомендации были повторно проанализированы членами рабочей группы, которые пришли к заключению, что все замечания и комментарии экспертов приняты во внимание, риск систематических ошибок при разработке рекомендаций сведен к минимуму.

Сила рекомендаций, уровни доказательств и индикаторы доброты естественной практики - good practice points (GPPs) приводятся при изложении текста рекомендаций.

Проблема трансфузионного обеспечения в акушерстве продолжает оставаться актуальной. Современные кровосберегающие технологии, включающие в себя современную диатнотистику и коррекцию железодефицитной анемии, аутоплазмодонорство, управляемую нормоволемическую гемодиллюцию, аппаратную интраоперационную реинфузию аутоэритроцитов позволяют минимизировать количество осложнений беременности, связанных с анемией, определить максимально эффективную лечебную тактику до родов, в процессе родоразрешения и в послеродовом периоде и тем самым улучшить исход беременности в целом.

Предлагаемые технологии предназначены для врачей акушерско-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов либо гематологов, работающих в перинатальных центрах, родильных домах, многопрофильных больницах, а также на станциях переливания крови или отделений трансфузиологии многопрофильных лечебных учреждений.

На интраоперационном этапе широко используются нормоволемическая гемодиллюция и аппаратная интраоперационная реинфузия аутоэритроцитов [1,5,8,9].

При сегоднешнем дефиците качественной донорской крови и опасности заражения опасными инфекциями преимуществва бескровной хирургии беспорны. Главный же принцип – сберечь как можно больше крови человека, оказывающегося на операционном столе (Эгльберт А. П., 1999).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ДО21	- индекс доставки кислорода
АД	- артериальное давление
АЧТВ	- активированное частичное тромбопластиновое время
ГЭК	- гидроксипропановый крахмал
ДВС	- диссеминированное внутрисосудистое свертывание
ЖДА	- железодефицитная анемия
ИОПСС	- индекс общего периферического сосудистого сопротивления
ИРА	- интраоперационная реинфузия аутогерицитрицитов
ИТП-индекс	- тромбодинамического потенциала
КОС	- кислотно основное состояние
КС	- ксарево сечение
КТГ	- кардиотокография
НГ	- нормоволемическая гемодилуция
ОЦК	- объем циркулирующей крови
ПА	- плазмаферез
ПСП	- показатель состояния плода
ПТИ	- протромбиновый индекс
РКИ	- рандомизированное контролируемое исследование
РКМФ	- растворимые комплексы мономеров фибрина
СЗП	- свежезамороженная плазма
СИ	- сердечный индекс
УИ	- ударный индекс
ЦВД	- центральное венозное давление
ЧСС	- частота сердечных сокращений

Как известно, в акушерстве одной из вечных проблем, над решением которых трудились многие поколения ученых, является кровотечение. Важность проблемы профилактики и лечения данного осложнения обусловлена тем, что акушерские кровотечения занимают одно из первых мест в структуре причин материнской смертности [6,7].

Научные исследования, проводимые в этой области, позволили достичь значительных положительных сдвигов в профилактике и лечении акушерских кровотечений. Большое значение для понимания патогенеза массивных кровотечений в акушерстве имело изучение механизмов развития синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, как основного компонента множества патологических состояний в акушерстве.

Появившиеся в последние годы современные гемостатические средства и новые плазмозамещающие растворы позволили значительно повысить эффективность проводимой при акушерских кровотечениях инфузионно-трансфузионной терапии. Однако до настоящего времени основной проблемой данной терапии является возмещение факторов свертывания и глобулярного объема, потерянных во время кровотечения [3,4,8]. Многие годы эта проблема решалась за счет донорской крови и ее компонентов, недостатки трансфузии которых общеизвестны: опасность заражения вирусными инфекциями, возможность тяжелых гемотрансфузионных осложнений. Выявлены значительные сдвиги в клеточном и гуморальном иммунитете реципиентов, получивших трансфузию донорских компонентов крови. Эти факторы заставили усомниться в безопасности донорской гемотрансфузии и потребовали переоценки показаний к ней.

Все это постепенно привело к мысли, что ставшее привычным переливание крови — далеко не панацея, что нужно и можно обойтись минимальной донорской помощью, а то и вовсе без нее. Сейчас такая точка зрения становится все более популярной среди специалистов.

Новейшие технологии бескровной хирургии (кровесбережения) очень быстро завоевывают все больше сторонников во всем мире. Действительно, способов сберечь кровь предостаточно, арсенал бескровной хирургии довольно обширен. Ее составными частями на предреципионном этапе является, прежде всего, коррекция анемии путем приема в арсенале современной медицины препаратов железа, препаратами эритропоэтина и методики аутодонорства: аутогемодонорство, аутоплазмодонорство.

Определение анемии и значимость проблемы
Железодефицитная анемия (ЖДА) (МКБ-10 D50) — синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа и проявляющийся анемией. По определению Всемирной Организации здравоохранения нижним пределом для уровня гемоглобина у беременных женщин считается <110 г/л в первом и третьем триместрах, <105 г/л во втором триместре, <100 г/л в послеродовом периоде. (СДС, 1998)

В зависимости от тяжести анемия выступает важным фактором риска заболеваемости и смертности для матери и плода [2,22,26,27]. Выраженный дефицит железа способствует увеличению риска преждевременных родов, внутриутробной задержке роста и развития плода. В случае анемии средней и тяжелой степени, даже при незначительной кровопотере в родах, возникает необходимость заместительной трансфузионной терапии эритроцитодержащими компонентами донорской крови и, соответственно, возрастает потенциальный риск осложнений, связанных с аллотенными гемотрансфузиями. В послеоперационном периоде дефицит железа способствует повышению частоты инфекционно-воспалительных осложнений. Наличие анемии перед родоразрешением ассоциируется с увеличением длительности пребывания в стационаре после родоразрешения, что приводит к повышению стоимости затрат на проводимое лечение. Предоперационная анемия ассоциируется с повышением послеоперационной смертности, повышением послеоперационной заболеваемости, увеличением длительности пребывания в стационаре после операции, ухудшением исходов лечения пациентов вне зависимости от проведения переливания крови (В-2а) [34,44].

Причины развития анемии и ее распространенность

Наиболее распространенной причиной анемии у беременных является дефицит железа (до 95%), тем более что 40% женщин имеют нарушения обмена железа до беременности.

Недостаточный запас железа в организме, нередко обусловлен особенностями диеты (вегетарианство), хроническими заболеваниями, желудочно-кишечного тракта или длительными обильными менструациями, что в связи с возрастающими потребностями в железе на фоне беременности приводит к развитию анемии [2,47,50].

Кроме того известно, что при беременности в организме женщины происходит ряд физиологических изменений, в том числе и со стороны крови. Общий объем плазмы увеличивается примерно на 30-50% от

исходного, а глобулярный объем возрастает только на 25%. Вследствие этого повышается потребность в микроэлементах и витаминах, необходимым как для синтеза Hb, так и для обеспечения нормального развития плода и плаценты. Обусловлено это множеством факторов: нередко беременность наступает при исходно сниженном уровне Hb, и анемия диагностируется в связи с более тщательным лабораторным контролем беременных женщин [26,28].

Диагностика железодефицитной анемии

Основа диагностики – изолированное снижение гемоглобина в общем анализе крови. Может быть выявлено уменьшение МСУ, МСН (микрцитоз), однако, при нормальной беременности МСУ несколько увеличивается, в связи с этим при нежелезных формах железодефицита МСУ у беременных остается в пределах нормы.

Критерии диагноза – снижение гемоглобина в общем анализе крови (менее 110 г/л), снижение ферритина сыворотки (менее 30 мг/дл).

Сывороточный ферритин – это гликопротеин, который вне воспалительного процесса четко отражает запасы железа в организме (являясь специфическим маркером воспаления, ферритин повышается в ответ на воспалительный процесс вне зависимости от истинных показателей феррокинетики). Но это первый и основной показатель, который снижается при недостатке железа. Кроме того, значение его не меняется в случае приема препарата железа накануне исследования (в отличие от железа сыворотки), поэтому ферритин является основным тестом для выявления железодефицита у беременных. Начальный этап формирования дефицита железа – истощение его запасов в организме, измеряемого уровнем сывороточного ферритина. Снижение ферритина менее 15 мг/дл является четким подтверждением железодефицита. При уровне ферритина ниже 30 мг/дл можно говорить об истощении необходимых запасов железа в организме и необходимости назначения препаратов железа во время беременности. Необходимо помнить о ложно-нормальных (либо повышенных) значениях ферритина, которые могут регистрироваться при наличии воспалительного процесса [23].

Для исключения воспалительных изменений исследуется уровень С-реактивного белка.

Следующим этапом формирования железодефицитного эритропоза является снижение транспорта железа, измеряемого насыщением трансферрина.

Железо и общая железозвязывающая способность сыворотки являются ненадежными индикаторами обеспечения организма железом в связи с влиянием употребления железа, суточными колебаниями значений.

Дополнительными параметрами дефицита железа могут служить снижение ретикулоцитов, повышение трансферрина.

Лечение железодефицитной анемии у беременных

Терапия при подтверждении железодефицита зависит от степени выраженности анемии и наличия сопутствующих изменений.

При анемии легкой степени (гемоглобин более 90 г/л) показана терапия пероральными препаратами железа в виде солей железа (II) или полимальтозы железа (III), 160-200 мг в день предпочтительно натощак за 1 час до еды, желателен в нескольких этапах беременности (уровень при истощении запасов железа на начальных этапах беременности (уровень ферритина ниже 30 мкг/л) на фоне отсутствия анемии, поскольку в период беременности потребность в железе возрастает).

В ряде случаев предпочтительен переход на внутривенное введение препаратов железа: при отсутствии ответа на прием железа внутрь (повышение уровня гемоглобина менее чем на 10 г/л через 14 дней лечения), несоблюдения назначенного лечения, переносимости пероральных препаратов железа (побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта), стремлении быстро достичь эффекта (на поздних сроках беременности, при лечении свидетелей Иеговы и в ряде других случаев).

При большей выраженности анемии (гемоглобин менее 80-90 г/л) необходима терапия препаратами железа парентерально.

Сахарин железа (III)

Мировая практика доказала безопасность и высокую переносимость комплекса железа (III) с сахаратом. Данный препарат одобрен для применения в период беременности, начиная со второго триместра, частота возникновения побочных эффектов при применении сахараата железа ниже 0,5%. Препарат следует вводить только в учреждении, располагающих оборудованием для сердечно-легочной реанимации. Максимальная разовая парентеральная доза сахараата железа (III) составляет 200 мг, предпочтительно развести препарат в 100 мл 0,9%-го раствора NaCl для введения в форме инфузии. Продолжительность инфузии составляет приблизительно 30 мин с использованием внутривенного доступа (следует помнить, что высокая скорость инфузии связана с риском гипотензивной реакции). В зависимости от исходных значений уровня гемоглобина внутривенное введение повторяют 1-3 раза в неделю, до повышения уровня

гемоглобина >105 г/л. Затем пациента можно перевести на прием пероральных препаратов железа для поддерживающей терапии. Не основываясь ожидать возможной передозировки железом.

Карбоксимальтозат железа

В настоящее время наиболее эффективным терапевтическим подходом позволяющим в кратчайшие сроки получить максимальный эффект, является применение карбоксимальтозата железа.

Карбоксимальтозат железа представляет собой недектрановый комплекс железа, преимуществом которого является возможность введения высоких доз в короткий промежуток времени.

Карбоксимальтозат железа вводят в виде быстрой инфузии в течение 15–30 мин или в виде болюса в течение 1–2 мин. В виде быстрой инфузии карбоксимальтозат железа можно вводить в разовых дозах до 1000 мг железа или, соответственно, 15 мг железа в расчете на 1 кг веса тела (до уровня жемаемой общей дозы); максимальная доза для внутривенного болюсного введения составляет 200 мг. Повторные инфузии проводятся еженедельно и рассчитаны на 15 мг железа на кг массы тела.

По данным Cochrane Database именно карбоксимальтозат железа является препаратом выбора терапии железодефицитной анемии при беременности. Как и в случае сахараата железа (III), данный препарат одобрен для применения в период беременности, начиная со второго триместра. Не модели плацентарного кровотока показано, что карбоксимальтозат железа не проникает через плацентарный барьер к плоду. При парентеральном введении железа повышение уровня гемоглобина происходит быстрее, чем при приеме внутрь. Внутривенное введение карбоксимальтозата железа повторяют 1 раз в неделю до повышения уровня гемоглобина >100 г/л. Затем пациента можно перевести на прием пероральных препаратов железа для поддерживающей терапии. Нет оснований ожидать возможной передозировки железом. В ряде рандомизированных многоцентровых исследованиях было проведено сравнение карбоксимальтозата железа, и заместительной терапии с приемом железа внутрь при лечении анемии. Исследования показали очень высокую безопасность применения, а также высокую эффективность карбоксимальтозата железа. Применение препаратов железа для в/в введения более эффективно в отношении увеличения уровня гемоглобина по сравнению с пероральными формами (A - 1b). Практическая польза, удобство для пациентов и снижение затрат, обусловленное необходимостью однократного введения, указывают на преимущество карбоксимальтозата железа перед ранее применяемым

сахаратом железа (III). Благодаря этому отсутствует необходимость в дорогостоящих повторных инфузиях небольших доз железа, при этом характеризуется хорошей переносимостью [37].

Лечение тяжелой анемии. При тяжелой анемии у беременных (гемоглобин <80 г/л) оправдано введение рекомбинантного эритропоэтина (рЭПО) в дополнение к парентеральному назначению карбоксимальтозата железа. Введение рЭПО улучшает результаты лечения анемии, но только в сочетании с парентеральным введением железа. рЭПО следует назначать только в случаях тяжелой анемии при наличии дополнительных факторов (выраженные клинические симптомы, отказ от переливания донорской крови и др.). Примерная дозировка: 150 МЕ/кг веса тела один раз в сутки подкожно, суммарно четыре дозы эритропоэтина альфа на фоне парентерального лечения с применением карбоксимальтозата железа. Внутривенное введение препаратов железа со стимуляторами эритропоэза сопровождается более быстрым и значимым увеличением содержания гемоглобина (A - 1a) [10].

Терапия препаратами железа для в/в введения сопровождается значительным снижением риска необходимости переливания аллотенных эритроцитов (A - 1a). Добавление внутривенного введения препаратов железа к лечению анемии и, следовательно, уменьшение частоты проведения переливаний крови может привести к сокращению расходов на лечение (A - 1b).

АУТОПЛАЗМОДОНОРСТВО

Проблема профилактики акушерских кровопотечений и восстановления кровопотери всегда актуальна и требует постоянного изучения и новых рациональных подходов к ее решению.

По литературным данным известно, что более 2/3 всех акушерских кровопотечений связаны с нарушением состояния гемостаза, т.е. являются первично коагулопатическими.

Основным компонентом инфузионно-трансфузионной терапии при коагулопатическом кровотечении считается свежемороженая плазма (СЭП), в которой в естественном сбалансированном состоянии сохранены все необходимые факторы, способствующие стабилизации гемостатического потенциала крови за счет восстановления баланса коагулянтной и антикоагулянтной систем [7,11-14].

Применяемые методы сбережения крови в предоперативном и периоперационном периоде включают предварительную заготовку аутокрови и/или аутоплазмы. Преимущества кровесберегающей хирургии

обусловлены отсутствием риска посттрансфузионных реакций и осложнений, передачи гемотрансмиссивных инфекций, отсутствием опасности аллоиммунизации.

В акушерстве более целесообразно использование аутоплазмодонорства, нежели аутогемотрансфузий, так как именно плазма является источником факторов свертывания крови.

Определение

Аутоплазмодонорство - метод кровесбережения, заключающийся в заготовке собственной плазмы индивидуума и предназначенный исключительно для последующей аутологичной трансфузии.

В акушерстве殊щность методики заключается сборе, замораживании и хранении плазмы женщины для последующего переливания ее во время или после родоразрешения с целью возмещения объема циркулирующей плазмы и факторов свертывания крови, а также купирования или лечения ДВС-синдрома.

Показания к заготовке и хранению аутоплазмы в акушерстве

1. Беременные группы высокого риска по развитию кровотечения.
2. Беременные с высоким риском по развитию гемотрансфузионных осложнений.
3. Беременные с редкими группами крови.
4. Отказ пациентки от переливания донорских компонентов крови, при отсутствии противопоказаний к аутодонации.

Противопоказания к заготовке аутоплазмы в акушерстве

1. Анемия - $Hb < 90 \text{ г/л}$, $Ht < 30\%$.
2. Типопротейнемия - общий белок $< 60 \text{ г/л}$, альбумин $< 35 \text{ г/л}$.
3. Изокоагуляция не характерная сроку беременности.
4. Заболевания крови - гемофилия, тромбоцитопения и др.
5. Тяжелая экстрагенитальная патология.
6. Онкологические заболевания.
7. Тромбозы.

Показания к трансфузии аутоплазмы в акушерстве

1. Кровотечение в родах или при абдоминальном родоразрешении.
2. ДВС-синдром.

Противопоказания к трансфузии аутоплазмы в акушерстве

1. Наличие выраженной типеркоагуляции перед родами и отсутствие кровотечения во время родов.

2. Наличие выраженной гиперкоагуляции в послеродовом или послеперационном периоде.

Материально-техническое обеспечение технологии

1. Система стерильных пластиковых контейнеров для сбора, фракционирования и хранения компонентов донорской крови.
2. Центрифуга производственная рефрижераторная, предназначенная для учреждений трансфузиологии и станций переливания крови.

3. Плазмозакрактор ручной.
4. Ручной механический либо диэлектрический запяватель магистралей.
5. Весы - поочиватель для крови электронные.
6. Аппарат для проведения плазмафереза с комплектом одноразовых магистралей к ним.
7. Раствор натрия хлорида изотонический физиологический (раствор $\text{NaCl } 0,9\%$) в стеклянных бутылках или пластиковых контейнерах.
8. Коллоидный плазмозамещающий раствор гидроксипропанового крахмала - ГЭК (6% или 10% 200/0,5, 130/0,4) 500 мл.
9. Антикоагулянт — гепарин либо раствор АСД-А (кислая декстроза).

Технология использования метода

Заготовка аутоплазмы проводится беременным, в сроках 32-37 недель, методом прерывистого или аппаратного плазмафереза однократно или двукратно с перерывом в неделю в условиях кабинета переливания крови или отделения транзитационной хирургии крови лечебного учреждения. За проведение процедуры отвечает врач, работающий в данных подразделениях лечебного учреждения.

- Обследование, необходимое для проведения аутоплазмодонорства
1. ВИЧ-1/ВИЧ2, RW, гепатит В, гепатит С;
 2. Гемостазиограмма;
 3. Группа крови, Rh-фактор;
 4. Клинический анализ крови;
 5. Общий белок крови.

Техника проведения прерывистого аутодонорского плазмафереза:

1. Пункция локтевой вены.
2. Введение плазмозамещающего раствора (физиологического раствора), количество которого определяется, исходя из общего состояния

женщины, уровня артериального давления, объема удаленной плазмы и составляет 200 - 400 мл и гепарина который вводится внутривенно перед началом плазмафереза в дозе 2500 ЕД.

3. Эксфузия крови в специальные пластиковые контейнеры в объеме 450-500мл.

4. Введение коллоидного плазмозамещающего раствора (6% ГЭК) в объеме 500 мл.

5. Отделение форменных элементов крови от плазмы в рефрижераторной центрифуге при мягком режиме центрифугирования при температуре 20°С.

6. Полученную плазму объемом 300-350 мл переводят в контейнер-спутник, форменные элементы крови разводят 100-150 мл физиологического раствора и реинфузируют. Стабилизацию крови осуществляют за счет гемоконсерванта типа АСД находящегося в контейнере.

Техника проведения антирагитного аутодонорского плазмафереза:

1. Пункция локтевой вены.

2. Введение плазмозамещающего раствора (физиологического раствора, стерофундин изотонический), количество которого определяется, исходя из общего состояния женщины, уровня артериального давления, объема удаленной плазмы и составляет 200 - 400 мл и гепарина который вводится внутривенно перед началом плазмафереза в дозе 2500 ЕД.

3. Подключение аппарата для плазмафереза, объем эксфузии плазмы 20-25% ОПЦ.

4. По окончании плазмафереза введение коллоидного (6% или 10% ГЭК) плазмозамещающего раствора. Соотношение объема плазмозамещения к объему плазмозамещения 1:1,5.

Полученная прерывистым или аппаратным методом аутоплазма маркируется «АУТОПЛАЗМА» только для аутологичной трансфузии», с указанием Ф.И.О., дата рождения, № истории родов, амбулаторной карты (Приложение №1).

Полученная аутоплазма сразу же подвергается замораживанию при температуре -35°С в быстросамораживателе и хранится при температуре -18°С. В указанном режиме аутоплазма может храниться до трех месяцев в специальном холодильнике для хранения аутоплазмы. Хранение аутоплазмы совместно с донорской свежесамороженной плазмой категорически запрещено.

Плазмозамещению регистрируют в журнале «Учета заготовки и переливания аутоплазмы», а в истории родов (амбулаторной карте) и обменной карте беременной делается отметка о заготовке аутоплазмы.

Во время родоразрешения аутоплазму размораживают при t-37°С в водяной бане или специальном размораживателе и переливают женщине.

Возможные осложнения, их профилактика и купирование

Осложнения, связанные с проведением аутодонорского плазмафереза:

1. Аллергические реакции на консервант (проводится десенсибилизующая терапия)

2. Синдром «нижней полой вены» (с целью предотвращения данного синдрома беременную укладывают на функциональную кровать в положении «на бок»)

3. Гипотония (необходимо остановить эксфузию крови, с целью коррекции АД проводят трансфузию коллоидных и кристаллоидных растворов)

Осложнения, связанные с трансфузией аутоплазмы:

1. Аллергические реакции на консервант (проводится десенсибилизующая терапия)

2. Выраженная гиперкоагуляция (назначается антикоагулянтная терапия)

Эффективность использования метода

Проведено обследование 212 женщин, которым в сроке 32-37 недель беременности применялось аутоплазмодонорство. Все обследованные беременные представляли группу риска по развитию кровотечений.

Для определения безопасности аутодонорского плазмафереза было проведено изучение состояния центральной и периферической гемодинамики и кислородтранспортной функции крови с использованием системы интегрального компьютерного мониторинга. В процессе исследования все беременные были разделены по типам кровообращения:

- Гиперкинетический тип - отмечался у 30 % беременных
- Эукинетический тип - отмечался у половины беременных
- Гипокинетический тип - выявлен у 20% беременных

При оценке гемодинамических параметров у беременных с гипер- и эукинетическим типами кровообращения на всех этапах аутодонорского плазмафереза все регистрируемые показатели находились в пределах нормативных значений. Коллебания сердечного индекса (СИ) наблюдались с 5,8±1,12 л/мин/м² до 5,1±1,17 л/мин/м² в момент эксфузии крови с последующим восстановлением во время инфузии растворов и реинфузии

эритроцитов до $5,4 \pm 1,21$ л/мин/м². Ударный индекс (УИ) также незначительно снижился во время эксфузии крови с $65,8 \pm 16,15$ мл/м² до $59,5 \pm 22,69$ мл/м², но после реинфузии эритроцитов повысился до $64,6 \pm 20,05$ мл/м². Колебания индекса доставки кислорода (ДО21) в течение всей процедуры аутодонорского плазмафереза равномерно и незначительны.

У беременных с гипокинетическим типом кровообращения во время эксфузии крови отмечалось кратковременное снижение сердечного индекса на 16% и индекса доставки кислорода на 13%. Однако, индекс доставки кислорода (ДО21) при этом остается в пределах нормативных значений за счет исходного высокого уровня гемоконцентрационных показателей крови, что свидетельствует об отсутствии условий для развития кислородной задолженности в организме беременной.

При аутодонорском плазмаферезе достоверных изменений состава периферической крови до и после заготовки аутоплазмы не выявлено, отмечается незначительное повышение содержания эритроцитов: до ПА - $3,88 \pm 0,15 \times 10^{12}/л$, после ПА - $3,96 \pm 0,13 \times 10^{12}/л$ и уровни гемоглобина: до ПА - $119,92 \pm 1,31$ г/л, после ПА - $120,48 \pm 1,48$ г/л ($p > 0,05$).

Особое внимание при проведении аутоплазмадонорства было уделено изучению состояния системы гемостаза. Доказано, что заготовка аутоплазмы у беременных должна проводиться проводилась на фоне гиперкоагуляции. Во время аутодонорского плазмафереза у всех беременных отмечалась умеренная гиперкоагуляция которая соответствовала нормативным показателям: концентрация фибриногена $-4,45 \pm 0,19$ г/л, ПТИ - $102,37 \pm 1,04$ %, АЧТВ - $32,1 \pm 2,32$ сек, РКМФ - отр ИТП - $16,82 \pm 0,861$ усл.ед, т+К = $17,89 \pm 1,542$ мм, та - $48,06 \pm 0,772$ мм. Перед родами у беременных не отмечалось повышения функциональной активности факторов свертывания: фибриноген $-4,93 \pm 0,18$ г/л, ПТИ - $108,38 \pm 1,26$ %, АЧТВ - $32,8 \pm 1,92$ сек, РКМФ - отр, ИТП - $14,01 \pm 0,772$ усл.ед, т+К = $21,5 \pm 2,031$ мм, та - $43,45 \pm 0,841$ мм. У 11,53% пациенток по данным гемостазиограммы отмечается наличие продуктов паракоагуляции. После родов на фоне физиологической кровопотери показатели системы гемостаза соответствовали умеренной гиперкоагуляции: фибриноген $-4,48 \pm 0,22$ г/л, ПТИ - $101,43 \pm 0,95$ %, АЧТВ - $33,1 \pm 1,64$ сек, РКМФ - отр, ИТП - $15,59 \pm 0,931$ усл.ед, т+К = $17,2 \pm 1,23$ мм, та - $48,05 \pm 0,713$ мм. Таким образом, применение аутоплазмы во время родоразрешения способствовало стабилизации гемоконцентрационного потенциала, обеспечив минимальную кровопотерю.

Изучение влияния аутодонорского плазмафереза на состояние плода проводилось на основании данных кардиотокографического и

доплерометрического исследований до и через 2 дня после процедуры аутоплазмадонорства у беременных женщин данной группы.

Доплерометрические исследования были проведены 30 беременным наблюдаемой группы. Проводилась регистрация спектров кривых скоростей кровотока левой и правой маточных артерий (маточно-плацентарный отдел аорты, средней мозговой артерии (фето-плацентарный кровоток). Критерием нарушения кровотока в данных сосудах служило повышение индекса периферического сосудистого сопротивления более чем на 2 сгмальных отклонения по сравнению с нормой. До аутодонорского плазмафереза имело место снижение маточно-плацентарного кровотока при сохранном плодово-плацентарном кровотоке у 20% беременных. Сочетанное нарушение фетоплацентарного и маточно-плацентарного кровотока при нарушении беременности наблюдалось у 20% беременных. Сочетанное отмечено у беременных наблюдаемой группы. У одной беременной отмечалось усиление кровотока в средне-мозговой артерии плода. У 76,6% беременных маточно-плацентарный и фето-плацентарный кровоток был в пределах нормы.

После аутодонорского плазмафереза снижение маточно-плацентарного кровотока отмечено уже у 13,3% женщин, у одной беременной сохранялось усиление кровотока в средне-мозговой артерии, у остальных беременных маточно-плацентарный и фето-плацентарный кровоток в пределах нормы.

Согласно данным антенатальной кардиотокографии, до заготовки аутоплазмы, у 23,3% беременных выявлены начальные признаки внутриутробного страдания плода. Показатель состояния плода (ПСП) колебался в пределах от 1,0 до 1,32 и в среднем составил 1,18 ± 0,461. У 46,6% беременных по данным кардиотокографии отмечалось нормальное состояние плода с позрением на патологично туповиньи (1 или 2-х кратное обвитие) - ПСП находились в пределах 0,2 до 0,78 и в среднем составили 0,54 ± 0,068. У 30% беременных (по данным КТГ, ПСП составили 0,01 ± 0,001. Выявленные нарушения состояния плода не зафиксированы ни у одной беременной. После проведения аутодонорского плазмафереза у беременных начальными признаками внутриутробного страдания плода уровень ПСП снижился и в среднем составил 1,1 ± 0,13, у остальных беременных, не имеющих признаков нарушения состояния плода, ПСП после заготовки аутоплазмы практически не изменился и составил 0,4 ± 0,05. Отсутствует отрицательное влияние аутоплазмадонорства на маточно-плацентарное и фетоплацентарное кровообращение. Анализ состояния плода по данным доплерометрии и кардиотокографии до и после проведения

аутоплазмодонорства свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния на маточно- и фето-плацентарное кровообращение (С -3). Аутоплазмодонорство у беременных является эффективным методом кровесбережения при учете критериев заготовки и использования аутоплазмы на основе гемостазиологического мониторинга на всех этапах аутоплазмодонорства (С -3). Трансфузия аутоплазмы, заготовленной у беременных на фоне физиологической гиперкоагуляции, во время родоразрешения способствует минимизации кровопотери за счет корригирующего влияния на состояние системы гемостаза при проявлениях хронического ДВС-синдрома, нарушениях механизмов адаптации системы гемостаза перед родами, приводящих к снижению коагуляционной активности крови. Использование аутоплазмы позволяет в 2 раза снизить применение донорской плазмы, а в ряде случаев и полностью отказаться от ее использования (С -3).

НОРМОВОЛЕМИЧЕСКАЯ ГЕМОДИЛИУЗИЯ С АУТОГЕМОТРАНСФУЗИЕЙ

Сущность методики управляемой нормоволемической гемодилюзии заключается в заготовке цельной крови пациента непосредственно в операционной до начала хирургического вмешательства, с последующей трансфузией изъятной крови в конце операции. Применение данного метода позволяет сохранить глобулярный компонент крови и способствует быстрому восстановлению гематологических показателей в послеоперационном периоде. Смысл метода заключается в дозированной разведке крови гемодилютантом, который снижает вязкость крови и периферическое сопротивление, обеспечивает полноценную кислородно-транспортную функцию крови с сохранением питохимических структур эритроцитов, приводя к повышению сердечного выброса и ударного объема, что сопровождается улучшением микроциркуляции и органного кровотока. Особенно важно то, что проведение операции при сниженных цифрах Нв и Не уменьшает абсолютное количество терямых в ходе операции эритроцитов. Так при снижении гематокрита до 25% с последующим возмещением кровопотери аутокровью предотвращается потеря половины эритроцитов. Кроме того, трансфузия заготовленной аутокрови в послеоперационном периоде способствует выполнению глобулярного компонента крови, позволяет отказаться от применения донорских эритроцитов, и, следовательно, избежать гемотрансфузионных и инфекционных осложнений [15].

Данная методика проста в исполнении, не требует специально обученного персонала и сложного оборудования и, что очень важно, экономически выгодна, что позволяет рекомендовать ее для широкого применения в акушерские стационары любого уровня.

Показания для проведения нормоволемической гемодилюзии с аутогемотрансфузией

Абсолютное родоразрешение у беременных группы риска по развитию кровотечения (предполагаемая кровопотеря более 20% объема циркулирующей крови) – рубец на матке после предыдущих операций кесарево сечение, многоплодие, беременность после программы ЭКО и ПЗ, наличие хронической формы ДВС синдрома, расширенные объемы операций, сочетанные показания к операции КС.

Беременные с высоким риском по развитию гемотрансфузионных осложнений Беременные с редкими группами крови при отказе пациентки от переливания донорских компонентов крови.

Противопоказания для проведения нормоволемической гемодилюции с аутогемотрансфузией

Гипотония - систолическое АД ниже 90 мм.рт.ст., диастолическое АД ниже 60 мм.рт.ст

Анемия - Нв < 90 г/л, Нг < 30%

Тромбоцитопения (< 150 10⁹/л)

Гипопротеинемия - общий белок < 60 г/л, альбумин < 35 г/л

Тяжелая экстрагепатальная патология (недостаточность кровообращения 2-3 ст., легочная недостаточность, тяжелая почечная патология, выраженная гипертензия, пиелоз печени, эпилепсия)

Презаказная тяжелой степени

Острые инфекционные заболевания

Онкологические заболевания

Заблевание крови.

Материально-техническое обеспечение проведения нормоволемической гемодилюции с аутогемотрансфузией

1. Инфузионный коллоидный раствор гидроксиэтилкрахмала (ГЭК 10%, 200/0,5) 500 мл.

2. Система контейнеров для сбора, фракционирования и хранения крови типа 500/300.

Методика проведения нормоволемической гемодилюции с аутогемотрансфузией

Методика нормоволемической гемодилюции заключается в заготовке цельной крови пациента непосредственно в операционной, с последующей трансфузией изъятной крови в конце операции по достижению хирургического гемостаза.

Процедуру выполняют на операционном столе после введения пациента в наркоз.

1. Предварительно в кубитальную вену осуществляется инфузия 250 мл 10% (6%) гидроксиэтилкрахмала (ГЭК 200/0,5). Выбор 6% или 10% раствора ГЭК производится в зависимости от данных коагулограммы: при изокоагуляции и умеренной гиперкоагуляции предпочтение отдается 6% раствору, при выраженной гиперкоагуляции - 10% раствору ГЭК.

2. Производится пункция коллатеральной кубитальной вены и эксфузия крови в стандартные пластиковые контейнеры, под постоянным контролем АД, ЧСС, Нг, ЦВД.

Объем извлекаемой крови может быть рассчитан по формуле Malcolm D. (1991):

$$V = P * (Ню - Нгк)$$

где V - объем извлекаемой крови в мл, P - масса тела пациента в кг * 70 (средний объем крови человека 70 мл/кг), Ню - гематокрит исходный в л/л, Нгк - гематокрит конечный в л/л.

3. По окончании эксфузии крови, осуществляется введение еще 250 мл 10% (6%) ГЭК 200/0,5.

4. Контейнеры с заготовленной аутокровью обязательно маркируют и хранят в операционной при комнатной температуре.

5. В конце операции, по достижению хирургического гемостаза, проводится реинфузия заготовленной аутокрови.

Возможные осложнения, их профилактика и купирование

1. Аллергические реакции на консервант, раствор гидроксиэтилкрахмала (проводится десенсибилизирующая терапия).

2. Синдром «нижней поллой вены» (с целью купирования данного синдрома изменяют положение беременной на операционном столе, укладывая ее в положение «на бок»).

3. Гипотония (необходимо остановить эксфузию крови, с целью коррекции АД проводят инфузию коллоидных и кристаллоидных растворов).

Контролируемые лабораторные параметры при проведении нормоволемической гемодилюции:

1. Артериальное давление, пульс;

2. Уровень гемоглобина, гематокрита, эритроцитов, тромбоцитов;

3. Гемостазиограмма.

Эффективность проведения нормоволемической гемодилюции с аутогемотрансфузией

Нормоволемическая гемодилюция с аутогемотрансфузией рекомендуется для женщин, у которых предполагается интраоперационная кровопотеря до 25% ОЦК (-3).

Нормоволемическая гемодилюция с аутогемотрансфузией должна выполняться только квалифицированным персоналом, регулярно ее

проводящим и имеющим необходимые знания и опыт. Должно быть получено согласие пациента на нормовололемическую гемодилюцию (С-3).

Нормовололемическая гемодилюция с аутогемотрансфузией в акушерских стационарах должна быть предметом аудита и мониторинга (С-3) [1,15,42].

Результаты проведения нормовололемической гемодилюции с аутогемотрансфузией при операции кесарева сечения

Таблица 1

Характеристика Группы исследований	Результаты исследований	Выводы
<p>240 беременных, которым в начале операции кесарева сечения с целью уменьшения потери эритроцитов была проведена нормовололемическая гемодилюция (НП) с последующей интраоперационной аутогемотрансфузией.</p>	<p>Центральная и периферическая гемодинамика - показано снижение ИОПСС после проведения НП на 33% по сравнению с исходным значением. Достоверное увеличение сердечного индекса (СИ) на 37%, и ударного индекса (УИ) на 30%. Достоверное увеличение систолического АД до $130,2 \pm 2,5$ мм.рт.ст. САД достоверно снизилось до $90,1 \pm 2,3$, ЧСС участилось но осталось в пределах нормы и равнялось $84,8 \pm 2,1$ уд/мин.</p> <p>По окончании кесарева сечения существенных изменений параметров гемодинамики не происходит. К 5-м суткам послеоперационного периода-возвращение параметров гемодинамики к исходным показателям.</p>	<p>Нормовололемическая гемодилюция с аутогемотрансфузией позволяет на время проведения операции улучшить объемные показатели кровотока, уменьшить сосудистый спазм и кислородную емкость крови, последнее приводит к снижению САД, в результате чего происходит увеличение венозного возврата, что выражается в увеличении УИ и СИ на фоне ЧСС. Данные свидетельствуют о стабильности параметров кровообращения на фоне проведения нормовололемической гемодилюции с аутогемотрансфузией при операции кесарева сечения. Все изменения показателей центральной и периферической гемодинамики не выходят за пределы нормы и по сути отражали компенсаторно-приспособительные реакции организма, направленные на улучшение микроциркуляции и увеличение оксигенации тканей.</p>

(С-3)

<p>Показания абдоминальному родоразрешению на матке после предыдущих операций кесарева сечения 40% и соответные показания 37,5%. Кормление грудью</p>	<p>к Показатели периферической крови - после проведения эксфузии крови вывлено достоверное снижение гематокрита с $0,37 \pm 0,05$ до $0,30 \pm 0,04$ л/л, что составило 23%. Уровень гемоглобина достоверно уменьшился на 17%: с $122,2 \pm 4,3$ до $104,2 \pm 3,5$ г/л, а эритроциты на 18%: с $3,81 \pm 0,18$ до $3,21 \pm 0,13$ х 10^{12}/л. Количество тромбоцитов уменьшилось на 6%, однако уменьшение не является достоверным ($p < 0,05$). После аутогемотрансфузии, в конце операции выделено достоверное увеличение гематокрита с $0,30 \pm 0,04$ до $0,32 \pm 0,07$ л/л. Показатель гемоглобина достоверно возрос с $104,2 \pm 3,5$ до $112,5 \pm 5,6$ х 10^{12}/л. Данная положительная динамика сохраняется у всех пациенток, и к 5-м суткам показатели гематокрита и гемоглобина практически вернулись к исходным параметрам. Количество эритроцитов достоверно увеличилось после проведения аутогемотрансфузии, составив $3,42 \pm 0,17$ х 10^{12}/л, и на 5-е сутки приблизилось к исходному показателю. Ни у одной пациентки не выявлено анемии послеоперационном периоде.</p>	<p>Эти изменения отражают состояние гемодиллюции, уменьшение вязкости крови, улучшение ее реологических свойств. Следует отметить, что все изменения, вызванные эксфузией, находились в безопасных пределах и с учетом данных о наличии в крови трехкратного резерва кислорода емкости, не представляли опасности для беременной и внутриутробного плода. Нормоволемическая гемодиллюция последующей интраоперационной аутогемотрансфузией в объеме 5-10 мл/кг от массы тела не вызывает выраженных изменений показателей периферической крови родильниц послеоперационном периоде. Аутогемотрансфузия резервированной в начале операции крови позволяет полноценно восполнить значительную часть общей операционной кровопотери и тем самым предупредить развитие крововращения и типоксии. (С-3)</p>
---	--	--

<p>Объем кровопотери в группе колеблется от 600 до 900 мл и в среднем составил $705,51 \pm 115$ мл. Объем реинфузированной аутокрови колеблется от 450 до 600 мл и в среднем составил $522,06 \pm 51,75$ мл.</p>	<p>Система гемостаза У всех пациенток показатели гемостаза до операции соответствовали умеренной гиперкоагуляции характерной для III триместра беременности. У 8 (20%) обследованных женщин выявлена активация внутрисосудистого свертывания проявляющийся налицем повышенной вязкости плазме высокомолекулярных растворимых фибриномономерных комплексов (РКМФ). На первые сутки послеоперационного периода у родильниц происходило достоверное снижение уровня фибриногена, а к 5-м суткам достоверное его увеличение.</p>	<p>Под влиянием нормоволемической гемодиллюции происходило незначительное снижение коагуляционного потенциала крови, которое не представляло угрозы в плане развития кровотечений. По окончании операции состояние гиперкоагуляции сохранялось. Это связано, во-первых, с трансфузией свежей аутокрови, во-вторых, с меньшим потреблением факторов свертывания за счет разведения при гемодиллюции. В послеоперационном периоде состояние системы гемостаза характеризовалось умеренной гиперкоагуляцией, свойственной для послеоперационного периода. (С-3)</p>
<p>КОС и газы крови: У пациенток после проведения нормоволемической гемодиллюции аутогемотрансфузией достоверных изменений значений КОС после операции не выявлено. В динамике параметров кислородного баланса отмечалось снижение O_2 ст на 16%, но при этом эффективный транспорт кислорода, Sat O_2 и парциальное напряжение кислорода в крови не претерпевали существенных изменений.</p>	<p>При нормоволемической гемодиллюции аутогемотрансфузией отмечается достаточное обеспечение тканей кислородом, что подтверждает безопасность метода кровосохранения. и</p>	<p>При нормоволемической гемодиллюции аутогемотрансфузией отмечается достаточное обеспечение тканей кислородом, что подтверждает безопасность метода кровосохранения. и</p>

	В послеоперационном периоде параметры КОС и газы крови находились в пределах нормативных значений.	
<p>Послеоперационный койко-день у женщин, которым во время кесарева сечения была выполнена нормоволемическая гемодилюция в среднем составил 7,4±0,5 дня, что достоверно ниже среднего показателя в стационаре 9,3±0,3.</p> <p>Необходимо проведение больших исследований</p>		<p>Проведение нормоволемической гемодилюции с аутогемотрансфузией при абдоминальном родоразрешении, позволяет обеспечить адекватное восполнение операционной кровопотери у беременных группы высокого риска по развитию кровотечения, благоприятное течение послеоперационного периода и не оказывает отрицательного влияния на новорожденного (С-3)</p>

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ РЕИНФУЗИЯ АУТОЭРИТРОЦИТОВ

Методика интраоперационной реинфузии аутоэритроцитов с использованием современных аппаратов типа является одним из наиболее эффективных методов кровесбережения во время операции. Специалистами нашего Центра впервые в мире данная методика предложена для применения в акушерстве.

Методика обеспечивает сбор теряемой крови из операционной раны, отмывание эритроцитов в центрифуге и возврат эритроцывзвеси в сосудистое русло пациентки при проведении родоразрешающих операций (кесарево сечение, кесарево сечение с консервативной миомэктомией, кесарево сечение с последующей ампутацией или экстирпацией).

Показания к проведению интраоперационной реинфузии эритроцитов при абдоминальном родоразрешении:

1. предложение и предложение временная отслойка нормально расположенной плаценты;
2. врожденные и приобретенные дефекты системы гемостаза;
3. многоплодная беременность;
4. слизистый процесс в брюшной полости;

5. варикозное расширение вен матки;
6. гемангиомы органов малого таза;
7. миома, аномалии развития матки;
8. разрыв матки;
9. расширение объема оперативного вмешательства.

Противопоказания к проведению интраоперационной реинфузии аутоэритроцитов в акушерстве.

Абсолютные

- наличие в брюшной полости гнойного содержимого;
- наличие в брюшной полости кишечного содержимого;
- наличие в излившейся крови веществ, противопоказанных к введению в сосудистое русло (перекись водорода, дистиллированная вода, гемостатические препараты на основе коллагена и др.).

Относительные

-наличие у больной злокачественного новообразования.
До недавнего времени проведение интраоперационной реинфузии во время операций по удалению злокачественных опухолей считалось абсолютно противопоказанным, ввиду высокого риска гематогенной диссеминации опухолевых клеток. Разрабатываются и внедряются эффективные методы очистки полученной аутоэритроплазмы от лейкоцитов и опухолевых клеток. Одним из таких способов является инфузия эритроконцентра через лейкоцитарный фильтр.

Материально-техническое обеспечение

1. Аппарат для аутотрансфузий, а так же наборы одноразовых магистралей к ним. Данные аппараты могут работать как в ручном, так и в автоматическом режимах. Однако наилучшее качество получаемой аутоэритроплазмы взвеси гарантирует работа в автоматическом режиме.
2. Раствор натрия хлорида изотонический физиологический (раствор NaCl 0,9%) 200мл или 400 мл, пластиковый контейнер 500 мл или 1000 мл.
3. Антикоагулянт.
4. Фильтр медицинский лейкоцитарный.

Технология использования метода

Принцип процедуры заключается в аспирации из операционной раны излившейся крови, обработке ее в аппарате и последующей реинфузии полученной аутоэритроплазмой взвеси (Ht ≈ 60%) обратно в сосудистое русло пациентки.

Заправка одноразовых магистралей проводится в операционной до начала операции. Стерильный отсос передается операционной сестре.

Обор извлекается в рану крови проводится вторым ассистентом. Острие иглы давления, создаваемое вакуум-аспиратором, не должно превышать 100 мм.рт.ст.

Кровь, аспирируемая из раны, смешивается с раствором антикоагулянта, проходит сквозь фильтр, задерживающий частицы тканей, сгустки крови и собирается в резервуар. Когда объем собранной крови станет эквивалентным объему, резервуара начинается первая фаза работы аппарата — заполнение промывочной чаши (колокола).

Данная фаза состоит из нескольких этапов:

1. Разгон центрифуги до 5600 об/мин.
2. Перенос крови из резервуара в промывочный колокол с помощью перистальтического насоса, начало процесса центрифугирования.
3. Наполнение промывочного колокола продолжается до тех пор, пока эритроциты не заполнят весь объем колокола (объем колокола может быть 125мл, 175мл, 225мл). Отделяющаяся в процессе центрифугирования плазма, удаляется вместе с антикоагулянтом в соответствующую емкость. После этого в автоматическом или ручном режиме начинается вторая фаза — отмывание эритроцитов в стерильном физиологическом растворе 0,9% NaCl.

Отмывание продолжается до тех пор, пока заданный объем промывочного раствора (в акушерстве 1000-1500 мл) не будет полностью проведен через эритроциты. Все это время происходит центрифугирование.

Заключительная фаза работы аппарата — опустошение колокола:

1. Центрифуга останавливается и перистальтический насос начинает вращение в обратном направлении.
2. Эритроцитарная взвесь переводится из промывочного колокола в мешок для реинфузии.

Далее процесс повторяется до тех пор, пока не будет обработана вся аспирированная из раны кровь. Продолжительность первого описанного цикла составляет — 3-5 минут.

Во время работы на дисплее аппарата четко отражены все необходимые параметры: скорость вращения центрифуги, скорость вращения насоса, количество перекачанного раствора. После каждого цикла работы высвечивается количество собранной и отмытых эритроцитов.

Реинфузия эритроцитарной взвеси должна осуществляться с использованием лейкоцитарного фильтра.

Возможные осложнения, их профилактика и купирование

При операции кесарево сечение необходимо помнить о наличии тромбопластических субстанций в околоплодных водах и возможности их переноса в сосудистое русло пациентки. Поэтому, по нашему мнению, перед операцией у беременной целесообразно пролечить амниотомию, использовать второй насос непосредственно после извлечения плода для аспирации околоплодных вод, сыровидной смазки и мекония. После этого можно пользоваться насосом для сбора и реинфузии. Кроме того, в конструкции аппарата предусмотрена возможность увеличения количества физиологического раствора, используемого для отмывания эритроцитов.

Контролируемые лабораторные параметры: Уровень гемоглобина, гематокрита, эритроцитов, тромбоцитов; гемостазиограмма перед операцией, во время кровотечения, в послеоперационном периоде; время образования сгустка по Ли-Уайту; биохимические параметры: общий белок, билирубин, креатинин, мочевина, калий, натрий, хлор. Общий анализ мочи.

Эффективность использования метода

ИРА рекомендуется для женщин, у которых предполагается интраоперационная кровопотери более 20% ОЦК (С-3).

ИРА должна выполняться только квалифицированным персоналом, регулярно ее проводилим и имевшим необходимые знания и опыт. Должно быть получено согласие пациента на проведение ИРА. Использование ИРА в акушерских стационарах должно быть предметом аудита и мониторинга [9,20,25,36,42,43].

Качество реинфузируемых аутоэритроцитов.

Изучение срока жизни отмытых эритроцитов показало, что он равен обычным эритроцитам. Отмывание эритроцитов существенно снижает уровень свободного гемоглобина, уменьшая тем самым риск возможной нефротоксичности реинфузируемых аутоэритроцитов. Реинфузируемая кровь не депонируется, а наиболее полноценно включается в русло циркуляции.

Доказательством безопасности применения реинфузии в акушерстве служат результаты электронно-микроскопического исследования получаемой суспензии эритроцитов: реинфузируемая жидкость представляет собой практически на 100% чистую суспензию эритроцитов (С-3).

Клиническая эффективность метода изучена более чем у 1000 беременных, которым во время операции кесарева сечения, с целью возмещения кровопотери аутоэритроцитами, проводилась интраоперационная реинфузия.

Наиболее частыми показаниями к абдоминальному родоразрешению явились: миома матки - 40% и рубец на матке после предыдущих операций кесарева сечения - 18,6%. Данный факт объясняется тем, что эти беременные входят в группу высокого риска по развитию кровотечения. Третьим по частоте показанием для абдоминального родоразрешения и интраоперационной реинфузии аутокрови стала беременность, наступившая в результате ЭКО и ПЭ (15%). Интересным представляется то, что в данной категории у половины беременных реинфузия была выполнена по их настоятельному желанию. Это обстоятельство связано с категорическим отказом этих женщин от использования донорских эритроцитов в случае возникновения у них кровотечения.

Доля экстренного родоразрешения составила в группе 27,8%. К экстренным показаниям относятся отслойка нормально расположенной плаценты, несоответственность рубца на матке, тяжелый гестоз. В остальных случаях операция кесарева сечения была произведена в экстренном порядке у женщин, готовящихся на плановое абдоминальное родоразрешение в связи с началом родовой деятельности или с преждевременным излитием околоплодных вод.

Средняя продолжительность оперативного вмешательства составила 65,5±5,12 мин.

Объем кровопотери в группе колебался от 700 до 3100 мл и в среднем составил 1460,51±115,32 мл. Объем реинфузированных аутоэритроцитов колебался от 250 до 1560 мл и в среднем составил 644,79±64,42 мл.

Нами было изучено влияние интраоперационной реинфузии аутоэритроцитов на состояние показателей периферической крови, в частности так называемой «красной крови» в зависимости от уровня кровопотери. В исходных показателях состава периферической крови достоверных различий не выявлено, уровень гемоглобина (Hb) в среднем составил 123,25±2,14 г/л, гематокрита (Ht) - 0,36±0,04 л/л, эритроцитов 4,01±0,31 × 10¹²/л.

При сравнении уровней гемоглобина, гематокрита и количества эритроцитов в послеоперационном периоде выявлено достоверное снижение данных показателей на первые сутки после операции, так уровень Hb в среднем составил 110,00±7,62 г/л, Ht - 0,30±0,03 л/л, эритроцитов 3,60±0,32 × 10¹²/л.

Необходимо отметить, что к 5-м суткам послеоперационного периода происходит достоверное увеличение уровня гемоглобина, гематокрита и эритроцитов до исходных показателей (Hb - 120,15±2,62 г/л, Ht - 0,39±0,01 л/л, эритроцитов 3,95±0,28 × 10¹²/л).

Представляет интерес динамика содержания тромбоцитов. На 1-е сутки происходит достоверное снижение уровня тромбоцитов (до операции

215,08±22,26 × 10⁹/л после 195,42 ± 6,27 × 10⁹/л), что свидетельствует о массивности и тяжести кровопотери. К 5-м суткам послеоперационного периода происходит достоверное увеличение количества тромбоцитов (232,08±39,55 × 10⁹/л), причем не только по отношению к показателям на 1-е сутки после операции, но и по отношению к данным до оперативного вмешательства.

Повышенный интерес представляло изучение системы гемостаза в подгруппах. Показатели тромбологостатрамы до операции соответствовали физиологическим адатационным изменениям системы гемостаза, характерными для III триместра беременности, то есть - типеркоагуляции.

У всех женщин выявлен высокий процент активации внутрисудистого свертывания крови, проявляющийся наличием в плазме высокомолекулярных растворимых фибрин-мономерных комплексов (РКМФ), выявляющихся маркерами ДВС - синдрома, данный показатель составил 90%.

На первые сутки послеоперационного периода происходит достоверное снижение уровня фибриногена, а к 5-м суткам достоверное его увеличение. Что касается показателей тромбологостатрамы, то достоверно изменяется только t-тк. На первые сутки происходит его увеличение, а на 5-е достоверное снижение до нормальных показателей.

Особый интерес представляет динамика изменения РКМФ в плазме крови. Так на первые сутки после операции данный показатель достоверно увеличился и стал положительным 100% пациенток соответственно. К пятым суткам происходит достоверное снижение количества пациенток в плазме крови, у которых определяется РКМФ до 31%.

Таким образом, проведенное исследование наглядно показало, что у всех женщин состояние системы гемостаза характеризуется структурной и хронометрической гиперкоагуляцией, протекающей у большинства по типу хронической формы ДВС-синдрома.

Анализ течения после родового периода у пациенток исследуемых подгрупп показал, что наиболее частым осложнением после родового периода была анемия. Анемия легкой степени выявлена у 3,5% рожениц, средней степени у 6,25% пациенток, а анемия тяжелой степени не выявлена ни в одном случае (С-3).

Анализ продолжительности пребывания пациенток в стационаре показал, что в среднем послеоперационный койко-день составил 8,2±0,2, что в 1,5 раза ниже, чем у пациенток, которым данный метод не применялся.

Таким образом, применение интраоперационной реинфузии аутоэритроцитов позволяет минимизировать использование донорских компонентов крови при кровопотере любого объема и избежать синдрома массивной гемотрансфузии, а также значительно улучшает течение послеоперационного периода и сокращает сроки пребывания больных в стационаре (В-2b).

ВАЖНО: В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О донорстве крови и ее компонентов» беременные женщины, участвующие в программах аутодонорства не могут являться донорами крови для других лиц, то компоненты аутокрови, полученные от них, могут быть использованы только для аутотрансфузии. Согласно техническому регламенту, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 г. № 29 «Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезаменяющих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии», используемые аутокомпоненты крови подлежат обязательной утилизации

Приложение №1
Классификация уровней достоверности и доказательности
рекомендаций
Таблица 2

Уровни доказательности	Описание
1a	Мета-анализы высокого качества, систематические обзоры рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), или РКИ с очень низким риском систематических ошибок
1b	Мета-анализы, систематические, или РКИ с высоким риском систематических ошибок
2a	Высококачественные систематические обзоры исследований случай-контроль или когортных исследований. Высококачественные обзоры исследований случай-контроль или когортных исследований с очень низким риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи
2b	Хорошо проведенные исследования случай-контроль или когортные исследования со средним риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи Исследования случай-контроль или когортные исследования с высоким риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней вероятностью причинной
3	Не аналитические исследования (например: описания случаев, серий случаев)
4	Мнение экспертов
Надежность клинических рекомендаций: градации по качеству	
A	Рекомендации основываются на качественных и надежных научных доказательствах
B	Рекомендации основываются на ограниченных или слабых научных доказательствах
C	Рекомендации основываются главным образом на согласованном мнении экспертов, клиническом опыте

Образец этикетки

Приложение №2.

**Наименование учреждения
здравоохранения**

АУТОПЛАЗМА

«ТОЛЬКО ДЛЯ АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСФУЗИИ»

№ кроводачи _____

ФИО _____

№ и/р _____ Дата рождения _____

Гр. Крови, Rh _____

Дата заготовки _____

Количество _____ мл

изг. из _____ мл

конс. _____ кол-во _____

Дата заготовки _____

Врач: _____

Хранить при t ниже -25°C 36 месяцев

Использовать в течение 30 мин. после размораживания.
Повторно не замораживать.

Приложение №3

**ПРОТОКОЛ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ
РЕИНФУЗИИ КРОВИ**

Фамилия, И.О. женщины _____

№ ист. Болемзи, ролгов _____ Дата операции _____

Количественный диализ _____

Хирургический диализ _____

Кровопотеря во время операции _____ Объем кровопотери _____

Название аппарата для реинфузии _____

Объем ирраскординированного физиологического раствора _____

Объем собраных эритроцитов _____ Из них перевели _____

Реакция на реинфузию _____

Гемотрансфузия донорской эрмассы _____

Трансфузия донорской плазмы _____

Показатели гемостаза: до операции / 1-е сутки \ 3-й сутки

НВ _____ г/л Нг _____ мл Эр. _____

Общий белок _____ г/л Общий биптробин _____ мксоль/л

ИПТ Прокбозагостограммы _____ у.е.

Подпись врача, _____

продолжительного реинфузию _____

Список литературы

1. Абубакирова А.М., Кулаков В.И., Баранов И.И. «Аутодонорство в акушерстве и гинекологии»./ Акуш.-гинекология.1996, №2, с. 6-7.
2. Бурлев В.А., Коноволова Е.Н., Орджоникидзе Н.В. и др. Лечение латентного дефицита железа и железodefицитной анемии у беременных. // Российский вестник акушера-гинеколога.-2006.- № 1.- С.64-68
3. Воробьев А.И., Городецкий В.М., Краснополюцкий В.И. Трансфузиологическая помощь при лечении острой массивной кровопотери у родильниц. Методические рекомендации. М. 2000.
4. Жибурт Е.Б. Безопасное переливание крови.- СПб: Издательство «Питер», 2000-320с.
5. Зильбер А.П. Взлет и падение гемотрансфузии: исторический анализ в период, переходный к эпохе безкровной хирургии. /Бескровная хирургия, итоги и перспективы. М., 2002, с. 10-17.
6. Интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии (эфферентные методы)/ Кулаков В.И., Серов В.Н., Абубакирова А.М., Федорова Т.А. // М., 1998, 206с.
7. Колесниченко А.П., Гришак Г.В. «Особенности этиопатогенеза, диагностики и интенсивной терапии ДВС-синдрома при критических состояниях в акушерско-гинекологической практике» Методические рекомендации. Красноярск., 2001, с.51
8. Константинов Б.А., Рагимов А.А., Давани С.А. Трансфузиология в хирургии. М., 2000, 528с.
9. Кулаков В.И., Серов В.Н., Абубакирова А.М. Клиническая трансфузиология в акушерстве, гинекологии и неонатологии// М.Триада-Х-2001-205с.
10. Дитманович К.Ю., Селиванов Е.А., Дуткевич И.Г. Проблемы безопасности и эффективности гемотрансфузионной терапии. «Эфферентная терапия» 2004г т10 №3 с37-47
11. Организация заготовки и применения аутологичной плазмы у беременных групп риска по кровотечению: методические рекомендации МЗ РФ №2003/6 от 2003г.
12. Организация трансфузионной терапии в лечебно-профилактических учреждениях: методические рекомендации (утв. Зам. Министра здравоохранения РФ)СР Г.В. Сергеев 28.11.1986), МЗ РСФСР, 1986г., с 43
13. Острая массивная кровопотеря// Воробьев А.И., Городецкий В.М., Шудутко Е.М., Васильев С.А/ Москва, ГЭОТАР-МЕД, 2001, 175с.
14. Чапчиев З.М., Чаленко В.В. Переливание крови в историческом аспекте.// Гематология и трансфузиология, 2003г, т.48, №1 с31-35
15. Шейкина Т.В.. Острая нормоволемическая гемодиллюция с аутогемотрансфузией при абдоминальном родоразрешении./ Автореф. Диссцо канд. Медицинск. 2011. 25с.
16. Arnold D.L., Williams M.A., Miller R.S., Qiu C., Sorensen T.K. Maternal iron deficiency anaemia is associated with an increased risk of abortion рlаsаntае – a retrospective case control study. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2009; 35: 446-452.
17. Veard J.L. Why iron deficiency is important in infant development. J. Nutr. 2008; 138: 2534-2536.
18. Beez M.G.: Нудохухеhуdаstаrсh: а new plаsmаsubstаtute for mаnаgement of hуdrovоlеmа and shock.// Int.Rev. Amed Fors Med Serv., 1994, v.7/8/9,-p.223.
19. Vаlсhаm M А., Vаshvаkаs E.C. The Cоnfining Risk of Trаnsfusіon-Trаnsmіtted Infесtіоns. N Engle J Med 2006;355:1303-5.
20. BLOOD TRANSFUSION IN OBSTETRICS RCOG Green-top Guideline No. 47, December 2007, Minor revisions July 2008
21. Vоlnаr J. Mаssіve obstetric hаemorrhаge.//Bаillіeres Best Prаct Res Clin Obstet Gynaecol 2000 Feb;14(1):1-18.
22. Vоllwеll TН. Iron requirements in pregnancy and strategies to meet them. Am J Clin Nutr. 2000; 72(1 suppl.): 257S-264S.
23. Vreуmаnn Ch. et al. Diagnosis and treatment of iron-deficiency anaemia during pregnancy and postpartum. Arch. Gynaecol. Obstet. 2010; 282:577-580.
24. Carlless P.A., Неру D.A., Mохеу АJ, O’Cоnnell D, Brown T, Fergusson D.A. Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion (Review) Copyright © 2010 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.
25. Sаtlіng SJ, Frettes O, Krishnan S, Gibbs R. Clinical experience with cell salvage in obstetrics: 4 cases from one UK centre. Int J Obstet Anaesth. 2002;11:128-34
26. Cogswell M.E., Раvаntа I., Ickes L., Уір R., Bгіttеnhаm G.M. Iron supplementation during pregnancy, anemia, and birthweight: a randomised controlled trial. Am. J. Clin. Nutr. 2003; 78: 773-781.
27. Solomеr J., Solomеr С., Gutierrez D., et al. Anaemia during pregnancy as a risk factor for infant iron deficiency: report from the Valencia

- Infant Anaemia Cohort (VIAC) study. *Paediatric and Perinatal Epidemiol.* 1990; 4: 196-204.
28. Eliz E., Agaoglu L., Karakas Z., Gurel N., Yalcin I. The effect of iron deficiency anemia on the function of the immune system. *Hem. J.* 2005; 5: 579-583.
 29. Gambling L., Lang C., McArdle H. J. Fetal regulation of iron transport during pregnancy. *Am. J. Clin. Nutr.* 2011; 94: 1903S-1907S.
 30. Gozzard D. When is high-dose intravenous iron repletion needed? Assessing new treatment options. *Drug Design, Development and Therapy.* 2011; 5: 51-60. *AGBI Guidelines for Obstetric Anaesthetic Services, Revised Edition 2005*
 31. Haas J.D., Brownlie T. Iron deficiency and reduced work capacity: a critical review of the research to determine a causal relationship. *J. Nutr.* 2001; 131: 676S-690S.
 32. Hallberg L. In: Foman SJ, Zlotkin S, eds. *Nutritional anemias.* New York: Raven Press; 1992: 13-28.
 33. Higgins S. Obstetric haemorrhage. // *Emerg Med (Fremantle).* 2003 Jun; 5(3): 227-231.
 34. Johnson-Wimbley T.D., Graham D.Y. Diagnosis and management of iron deficiency anemia in the 21st century. // *Therap. Adv. Gastroenterol.* - 2011. - Vol. 4 (3). - P.177-84.
 35. Insel B.J., Schaefer C.A., McKeague I.W., Susser E.S., Brown A.S. Maternal iron deficiency and the risk of schizophrenia in offspring. *Arch. Gen. Psychiatry.* 2008; 65: 1136-1144.
 36. Intra-operative blood cell salvage in obstetrics. National Institute for Health and Clinical Excellence, November 2005, Minor maintenance 22 January 2012
 37. Lyseng-Williamson K.A., Keating G.M. Ferric carboxymaltose: a review of its use in iron-deficiency anaemia. *Drugs.* 2009; 69: 739-756.
 38. Milman N. Prepartum anemia: Prevention and treatment. *Ann. Hematol.* 2008; Dec 87: 949-959.
 39. Pahlavan P, Nezhad C, Nezhad C, Hemorrhage in obstetrics and gynecology. // *Curr Opin Obstet Gynecol.* 2001 Aug;13(4):419-24.
 40. Perez E.M., Hendricks M.K., Beard J.L., et al. Mother-infant interactions and infant development are altered by maternal iron deficiency anemia. *J. Nutr.* 2005; 135: 850-855.
 41. Prevention and management of post-partum haemorrhage, RCOG Green-top Guideline 2009;52:1-24.

42. Prowse C.V/ Alternatives to human blood and blood resources. // *Vox Sang.* -1998. - Vol.74,№2-P-21-28.
43. Reiner DS, Tortolani AJ. Postoperative peritoneal blood salvage with autotransfusion after hepatic trauma. // *Surg Gynecol Obstet* 1991; 173(1):501-4.
44. Reveiz L., Gyte GML., Cuervo L.G., Casasbuenas A. Treatments for iron-deficiency anaemia in pregnancy (Review). *Cochrane Library.* 2011.
45. Reyat F, Sibony O, Oury JF, Luton D, Bang J, Blot P. Criteria for transfusion in severe postpartum hemorrhage: analysis of practice and risk factors. // *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2004 Jan 15;112(1):61-4.
46. Saa P, Castilla J, Presymptomatic detection of prions in blood. *Science* 2006;313:92-4.
47. Scholl T.O., Hediger M.L. Anemia and iron-deficiency anemia: compilation of data on pregnancy outcome. *Am. J. Clin. Nutr.* 1994; 59: S492-S501.
48. Selo-Ojeme D.O. Primary postpartum haemorrhage. // *J Obstet Gynaecol* 2002 Sep;22(5):463-9.
49. Tapiero H, Gate' L., Tew, K.D. Iron: deficiencies and requirements. *Biomedicine and Pharmacotherapy.* 2001; 55: 324-332.
50. Van den Broek N.R., Letsky E.A., White S.A., Shenkin A. Iron status in pregnant women: which measurements are valid? *Br. J. Haem.* 1998; 103: 817-824.
51. Wise V. C. Challenges of major obstetric haemorrhage. *Best Practice Research Clinical Obstetrics and Gynaecology.* 2010; 24:353-365